



¿Qué hay que saber cuando se utiliza Depo-Provera como método anticonceptivo?



Se necesitan 7 días para que Depo-Provera empiece a surtir efecto para prevenir el embarazo. Asegúrate de utilizar un segundo método anticonceptivo, como el preservativo, durante ese tiempo.



Depo-Provera no previene las infecciones de transmisión sexual (ITS). Utiliza preservativos y hazte pruebas al menos una vez al año.



Children's Hospital Colorado
Here, it's different.™



GINECOLOGÍA PEDIÁTRICA Y DE LA ADOLESCENCIA


Depo-Provera

Depo-Provera (acetato de medroxiprogesterona de depósito) es una inyección que se administra cada 3 meses en la clínica o en casa con una jeringa precargada. A veces se le denomina también "depo" o "la inyección". Depo-Provera es un método basado únicamente en progestina, lo que significa que es seguro para la mayoría de las personas. El medicamento de la inyección adelgaza el revestimiento del útero, por lo que habrá menos sangrado y cólicos. Depo-Provera también se utiliza como tratamiento para la endometriosis y el dolor pélvico.

Además, Depo-Provera bloquea la ovulación, lo que puede mejorar el síndrome premenstrual y otras afecciones causadas por los cambios mensuales en los niveles hormonales. Aproximadamente la mitad de las personas dejan de tener la menstruación poco después de la primera inyección y alrededor de la mitad presentan manchado y sangrado vaginal que desaparecen con el tiempo. Después de usar este medicamento durante un año, entre el 50 y el 80% de las usuarias dejan de tener períodos menstruales por completo. La inyección es también un método anticonceptivo muy eficaz.

¿Cómo se pone la inyección en casa?

- Informa a tu médico si te sientes con la suficiente confianza como para ponerte la inyección en casa, y este enviará un pedido de DEPO-SUBQ PROVERA 104® a tu farmacia.
- DEPO-SUBQ PROVERA 104® se presenta en una jeringa precargada. "SUBQ" significa "subcutánea". Esto significa que la inyección se administra debajo de la piel, en la parte superior del brazo, en la parte inferior del estómago o en el muslo.



¿Qué pasa si es tarde para ponerme la inyección?

- Si han pasado más de 15 semanas desde tu última inyección, llámanos al 720-777-2667 o envíanos un mensaje, y te ayudaremos a volver a empezar con Depo-Provera.

¿Cuáles son los efectos secundarios?

- Es habitual que se produzcan sangrados irregulares, en especial durante los primeros 3-6 meses de uso de Depo-Provera.
- Algunas personas notan que tienen hambre con más frecuencia de lo habitual. Informa a tu médico si te preocupa tu apetito o el aumento de peso.
- Algunas personas pueden sufrir pérdida de densidad ósea si han estado en tratamiento con Depo-Provera más de 2 años. Esta pérdida ósea se recupera parcial o totalmente cuando se suspende el uso de Depo-Provera.
- Cuando una persona decide dejar de utilizar Depo-Provera, pueden pasar entre 3 y 9 meses para que vuelva a tener períodos menstruales normales.

Más información



childrenscolorado.org/Gyn



720-777-2667



Children's Hospital Colorado
Here, it's different.™